



Roma, 5.1.2021

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 20210000062/AG  
Oggetto: AIFA – Nota informativa importante Fluorochinoloni ad uso sistemico ed inalatorio:  
Circolare n. 12732

Sito sì  
8.4  
Ifo sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***AIFA - nota informativa importante Fluorochinoloni ad uso sistemico ed inalatorio:  
rischio di rigurgito/insufficienza delle valvole cardiache.***

Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si trasmette la nota dell'AIFA, concordata con le autorità regolatorie europee, sul rischio di rigurgito/insufficienza delle valvole cardiache correlato all'utilizzo degli antibiotici Fluorochinoloni ad uso sistemico ed inalatorio.

In particolare si evidenziano i seguenti punti.

- I fluorochinoloni per uso sistemico e inalatorio possono aumentare il rischio di rigurgito/insufficienza delle valvole cardiache.
- Le condizioni che predispongono al rigurgito/insufficienza delle valvole cardiache includono patologie congenite o preesistenti delle valvole cardiache, malattie del tessuto connettivo (ad esempio la sindrome di Marfan e la sindrome di Ehlers-Danlos), la sindrome di Turner, la malattia di Behet's, l'ipertensione, l'artrite reumatoide e l'endocardite infettiva.
- Nei pazienti a rischio di rigurgito/insufficienza delle valvole cardiache, i fluorochinoloni per uso sistemico e inalatorio devono essere utilizzati solo dopo attenta valutazione del rapporto beneficio/rischio e dopo aver preso in considerazione altre opzioni terapeutiche.
- I pazienti devono essere avvisati di rivolgersi immediatamente al medico in caso di dispnea acuta, insorgenza de novo di palpitazioni, o comparsa di edema addominale o degli arti inferiori.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1